TECVAYLI®
(teclistamab-cqyv) Injection for subcutaneous use
10 mg/mL and 90 mg/mL

Su guía para comenzar

Comenzar el tratamiento con TECVAYLI®

En esta guía encontrará información útil sobre la administración y la seguridad de TECVAYLI®, todo ello diseñado para brindarle apoyo a medida que comienza su recorrido por el tratamiento.

¿Qué es TECVAYLI® (teclistamab-cqyv)?
TECVAYLI® es un medicamento con receta para el tratamiento de adultos con mieloma múltiple que:

- ya han recibido al menos 4 regímenes terapéuticos, incluido un inhibidor del proteasoma, un agente inmunomodulador y un anticuerpo monoclonal anti-CD38 para tratar su mieloma múltiple,
  y
- cuyo cáncer haya regresado o no respondió al tratamiento anterior.

TECVAYLI® fue aprobado en función de las respuestas de los pacientes. Hay estudios en curso para confirmar el beneficio clínico de TECVAYLI®.

Se desconoce si TECVAYLI® es seguro y eficaz para niños.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre TECVAYLI®?

TECVAYLI® puede causar efectos secundarios que son graves, potencialmente mortales o que provocan la muerte, incluidos el Síndrome de Liberación de Citocinas (Cytokine Release Syndrome, CRS) y problemas neurológicos.

Lea la Información de seguridad importante completa en las páginas 4 a 7, y la Información completa de prescripción, incluido el Recuadro de ADVERTENCIAS, de TECVAYLI®.

RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN DE TECVAYLI®

TECVAYLI® (teclistamab-cqyv) Injection for subcutaneous use 10 mg/mL and 90 mg/mL

TECVAYLI® es un tratamiento listo para usar y lo administra:

Un médico o personal de enfermería en forma de monoterapia, lo que significa que no se administra en combinación con otras terapias para el mieloma múltiple recidivante o refractario (Relapsed or Refractory Multiple Myeloma, RRMM).

Como una inyección subcutánea debajo de la piel, generalmente en el área del estómago (abdomen), el muslo u otra zona del cuerpo.

TECVAYLI® comienza con una administración "escalonada"

Se realiza una administración escalonada para reducir la probabilidad de contraer el síndrome de liberación de citocinas (CRS) iniciando TECVAYLI® de a poco, con una dosis más baja. Antes de cada dosis escalonada y su primera dosis de tratamiento, recibirá medicamentos para ayudar a reducir su riesgo y/o la gravedad de un efecto secundario grave o potencialmente mortal conocido como CRS. Debe ser hospitalizado durante 48 horas después de recibir cada dosis en el régimen de administración escalonada. La cantidad de TECVAYLI® que recibirá dependerá de su peso corporal.

RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN ESCALONADA DE TECVAYLI®



La dosis escalonada 2 y/o la primera dosis de tratamiento pueden administrarse entre 2 y 4 días después de la dosis escalonada anterior.

Su proveedor de atención médica decidirá la cantidad de días que deben transcurrir entre sus dosis de TECVAYLI® y cuántos tratamientos recibirá. Su régimen de administración puede cambiar para que su equipo de atención médica pueda controlar cualquier efecto secundario.

Lea la Información de seguridad importante completa en las páginas 4 a 7, y la Información completa de prescripción, incluido el Recuadro de ADVERTENCIAS, de TECVAYLI®.

El tratamiento continuo será una administración semanal que puede cambiarse a una administración cada 2 semanas para ciertos pacientes

Después de la administración escalonada, TECVAYLI® se administra semanalmente. Si su proveedor de atención médica determina que usted está respondiendo (una respuesta completa o mejor) y continúa respondiendo durante al menos 6 meses, es posible que pueda recibir su tratamiento una vez cada 2 semanas.

RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN DE DOSIS CONTINUO DE TECVAYLI®



Su proveedor de atención médica determinará si debe cambiar el régimen de administración y cuándo debe hacerlo, en función de su respuesta y cuánto tiempo recibirá el tratamiento. Después de las dosis escalonadas, su proveedor de atención médica también decidirá si necesita recibir medicamentos para ayudar a reducir su riesgo de tener CRS con dosis futuras.

Informe a su médico o proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma actualmente, incluidos los medicamentos de venta con receta y los de venta libre, las vitaminas y los suplementos naturales.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre TECVAYLI®?

TECVAYLI® puede causar efectos secundarios que son graves, potencialmente mortales o que provocan la muerte, incluidos el Síndrome de Liberación de Citocinas (CRS) y problemas neurológicos.

Llame a su proveedor de atención médica de inmediato si desarrolla alguno de los signos o síntomas de CRS o de los problemas neurológicos que se enumeran a continuación en cualquier momento durante su tratamiento con TECVAYLI®:

Síndrome de Liberación de Citocinas (CRS). Entre los signos y síntomas del CRS se incluyen los siguientes:

- fiebre (100.4 °F o más)
- dificultad para respirar
- escalofríos
- mareos o aturdimiento
- latidos rápidos
- sensación de ansiedad
- confusión o inquietud
- dolor de cabeza
- aumento de las enzimas hepáticas en la sangre

Problemas neurológicos. Entre los síntomas de problemas neurológicos con TECVAYLI® se incluyen los siguientes:

- dolor de cabeza
- movimientos espasmódicos
- rigidez muscular
- sensación de intranquilidad
- adormecimiento y hormigueo (sensación de “alfileres y agujas”)
- confusión
- problemas para hablar
- espasmos musculares
- temblores
- visión doble
- cambios en la caligrafía
- problemas para caminar
- debilidad muscular en el cuerpo o la cara
- pérdida de la audición
- dolor ardiente, palpitante o punzante

- Debido al riesgo de CRS y síntomas neurológicos, debe ser hospitalizado durante 48 horas después de todas las dosis de TECVAYLI® que forman parte del “régimen de administración escalonada”. El “régimen de administración escalonada” comienza cuando recibe las primeras 2 dosis de TECVAYLI®, que se denominan dosis “escalonadas”, y luego recibe la primera “dosis de tratamiento” de TECVAYLI®. Después de la “dosis escalonada 1” de TECVAYLI®, se aumenta la dosis de TECVAYLI®. Después de la “dosis escalonada 2”, la dosis se aumenta nuevamente cuando recibe la primera “dosis de tratamiento” de TECVAYLI®.
  - La “dosis escalonada 1” se administra el día 1 de tratamiento. La “dosis escalonada 2” se administra generalmente el día 4 de tratamiento. La primera “dosis de tratamiento” generalmente se administra el día 7 de tratamiento.
  - Su proveedor de atención médica decidirá cuándo recibirá la “dosis escalonada 2” y su primera “dosis de tratamiento”.
    - La “dosis escalonada 2” se puede administrar entre 2 y 4 días después de la “dosis escalonada 1”, o hasta 7 días después de la “dosis escalonada 1” si tiene ciertos efectos secundarios con TECVAYLI®.
    - Su primera “dosis de tratamiento” se puede administrar entre 2 y 4 días después de la “dosis escalonada 2”, o hasta 7 días después de la “dosis escalonada 2” si tiene ciertos efectos secundarios con TECVAYLI®.
  - Su proveedor de atención médica decidirá la cantidad de días que deben transcurrir entre sus dosis de TECVAYLI® así como también cuántos tratamientos recibirá.
  - Si su dosis de TECVAYLI® se retrasa por algún motivo, es posible que deba repetir el “régimen de administración escalonada” para recibir TECVAYLI®.
  - Antes de cada “dosis escalonada” y su primera “dosis de tratamiento” de TECVAYLI®, recibirá medicamentos para ayudar a reducir el riesgo de tener CRS. Su proveedor de atención médica decidirá si necesita recibir medicamentos para ayudar a reducir su riesgo de tener CRS con dosis futuras.
- Su proveedor de atención médica lo controlará para detectar signos y síntomas de CRS y problemas neurológicos durante el tratamiento con TECVAYLI®, así como otros efectos secundarios y lo tratará según sea necesario.

- **No conduzca ni opere maquinaria pesada o peligrosa durante y por 48 horas después de la finalización de su “régimen de administración escalonada” de TECVAYLI®, o en cualquier momento durante el tratamiento con TECVAYLI® si desarrolla nuevos síntomas neurológicos hasta que estos desaparezcan.**

TECVAYLI® está disponible solo a través de la Estrategia de Evaluación y Mitigación de Riesgos (REMS) de TECVAYLI® y TALVEY™ debido al riesgo de CRS y problemas neurológicos.

Su proveedor de atención médica le entregará una Tarjeta de Paciente. **Debe llevarla con usted en todo momento y mostrársela a todos sus proveedores de atención médica.** La Tarjeta de Paciente enumera los signos y síntomas del CRS y los problemas neurológicos.

Su equipo de atención se inscribirá en el programa REMS
y le proporcionará una Tarjeta de Paciente para que la lleve con usted.
No necesita inscribirse en el programa REMS.

Obtenga ayuda médica de inmediato si presenta alguno de los signos y síntomas que se enumeran en la Tarjeta de Paciente.
Quizás sea necesario que reciba tratamiento en un hospital.
- Si tiene alguna pregunta sobre TECVAYLI®, consulte a su proveedor de atención médica.
- Su proveedor de atención médica puede suspender temporalmente o suspender por completo su tratamiento con TECVAYLI® si desarrolla CRS, problemas neurológicos o cualquier otro efecto secundario que sea grave.

Consulte **“¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de TECVAYLI®?”** para obtener más información sobre los efectos secundarios.

Antes de recibir TECVAYLI®, comuníquele a su proveedor de atención médica todas sus enfermedades, incluso si usted:

- tiene una infección
- está embarazada o planea de quedar embarazada. TECVAYLI® puede dañar a su bebé en gestación.
  - Su proveedor de atención médica debe hacerle una prueba de embarazo antes de que comience el tratamiento con TECVAYLI®.
  - Debe usar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento y durante 5 meses después de la última dosis de TECVAYLI®.
  - Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si queda embarazada o cree que puede estarlo durante el tratamiento con TECVAYLI®.
- está amamantando o tiene previsto hacerlo. Se desconoce si TECVAYLI® se traspasa a través de la leche materna. No amamante durante el tratamiento y durante 5 meses después de su última dosis de TECVAYLI®.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos de venta con receta y los de venta libre, las vitaminas y los suplementos naturales.

¿Cómo recibiré TECVAYLI®?

- Su proveedor de atención médica le administrará TECVAYLI® como una inyección debajo de la piel (inyección subcutánea), generalmente en el área del estómago (abdomen). También se puede inyectar en el muslo o en otra zona del cuerpo.

¿Cómo recibiré TECVAYLI®? (más)

- **Consulte "¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre TECVAYLI®?" al comienzo de esta Información de seguridad importante para obtener información sobre cómo recibirá TECVAYLI®.**

Si falta a alguna cita, comuníquese con su proveedor de atención médica lo antes posible para reprogramarla. Es importante que lo controlen de cerca para detectar efectos secundarios durante el tratamiento con TECVAYLI®.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de TECVAYLI®?

TECVAYLI® puede causar efectos secundarios graves, como los siguientes:

- Consulte **"¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre TECVAYLI®?".**
- **Problemas hepáticos**. TECVAYLI® puede causar problemas hepáticos que pueden conducir a la muerte. El aumento de la bilirrubina y las enzimas hepáticas en la sangre es común con TECVAYLI® y, en ocasiones, también puede ser grave. Estos aumentos de las enzimas hepáticas pueden ocurrir con o sin que usted también tenga CRS. Su proveedor de atención médica lo controlará para detectar estos problemas antes de comenzar y durante el tratamiento con TECVAYLI®. **Informe a su proveedor de atención médica si presenta algún síntoma de un problema hepático, incluidos los siguientes:**
  - cansancio
  - pérdida del apetito
  - dolor en la parte superior derecha del estómago (abdomen)
  - orina oscura
  - color amarillento en la piel o en la esclerótica (parte blanca) de los ojos
- **Infecciones**. Las infecciones del tracto respiratorio superior y la neumonía son comunes con TECVAYLI®. TECVAYLI® puede causar infecciones bacterianas y virales que son graves, potencialmente mortales o que pueden causar la muerte.
  - Su proveedor de atención médica lo controlará para detectar signos y síntomas de infección antes y durante el tratamiento con TECVAYLI®.
  - Su proveedor de atención médica puede recetarle medicamentos para ayudar a prevenir infecciones y tratarlo según sea necesario si desarrolla una infección durante el tratamiento con TECVAYLI®.
  - Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si presenta fiebre, escalofríos o cualquier signo o síntoma de una infección.
- **Disminución en el recuento de glóbulos blancos**. La disminución en el recuento de glóbulos blancos es común con TECVAYLI® y también puede ser grave. A veces, también se produce fiebre con recuentos bajos de glóbulos blancos y puede ser un signo de que tiene una infección. Su proveedor de atención médica verificará sus recuentos de células sanguíneas antes de comenzar y durante el tratamiento con TECVAYLI®, y lo tratará según sea necesario.
- **Reacciones alérgicas y reacciones en el lugar de la inyección**. TECVAYLI® puede causar reacciones alérgicas que pueden afectar todo el cuerpo (sistémicas) y también causar reacciones en el lugar de la inyección.
  - Algunas personas que reciben TECVAYLI® pueden desarollar síntomas de una reacción alérgica que puede afectar a todo el cuerpo y puede incluir fiebre o hinchazón de la lengua. **Obtenga ayuda médica de inmediato si desarrolla síntomas de una reacción alérgica durante el tratamiento con TECVAYLI®**.
  - Las reacciones en el lugar de la inyección son comunes con TECVAYLI® y pueden incluir: enrojecimiento, calor, hinchazón, hematomas, infección bacteriana de la piel (celulitis), molestias, acumulación de sangre debajo de la piel en el lugar de la inyección (hematoma) y sarpullido. Informe a su proveedor de atención médica si presenta alguna reacción grave en el lugar de la inyección.

Su proveedor de atención médica puede suspender TECVAYLI® de manera temporal o permanente si tiene alguno de los efectos secundarios mencionados anteriormente y estos son graves.

Los efectos secundarios más comunes de TECVAYLI® son los siguientes:

- fiebre
- dolor en las articulaciones y los músculos, los músculos de la espalda y el pecho, y en los brazos y las piernas
- cansancio y debilidad
- infección del tracto respiratorio superior y neumonía. Consulte "Infecciones" arriba.
- náuseas
- dolor de cabeza
- diarrea

Los resultados anormales graves más comunes de los análisis de laboratorio con TECVAYLI® incluyen: disminución de los glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de TECVAYLI®.

Llame al médico para pedir asesoría médica sobre los efectos secundarios. Puede informar sobre los efectos secundarios llamando a la FDA al 1-800-FDA-1088.

Lea la Información completa de prescripción, incluido el Recuadro de ADVERTENCIAS, de TECVAYLI®.

cp-426658v1

La administración escalonada puede ayudar a reducir la probabilidad de contraer CRS y su gravedad. TECVAYLI® activa las células inmunitarias para ayudar a combatir la enfermedad. Esta activación puede causar un efecto secundario grave o potencialmente mortal denominado Síndrome de Liberación de Citocinas (CRS).

Su proveedor le administrará medicamentos previos y usará una administración escalonada para reducir la probabilidad y gravedad de CRS. También pueden ser necesarios medicamentos previos al tratamiento para las dosis administradas después de un retraso de la dosis.

- La mayoría de los casos de CRS se produjeron durante las primeras 3 dosis.
  - El 42 % de las personas que recibieron TECVAYLI® experimentaron CRS después de la dosis escalonada 1, el 35 % después de la dosis escalonada 2 y el 24 % después de la dosis de tratamiento inicial (la tercera dosis).
  - Menos del 3 % de las personas que recibieron TECVAYLI® tuvieron una primera aparición de CRS después de la tercera dosis.
- La mediana del tiempo hasta la aparición del CRS fue de 2 días (con un rango de 1 a 6 días) después de la dosis más reciente. La mediana del tiempo que duró el CRS fue de 2 días (con un rango de 1 a 9 días).

Su equipo de atención médica puede cambiar su plan de tratamiento si experimenta efectos secundarios.

TECVAYLI® (teclistamab-cqyv) Injection for subcutaneous use 10 mg/mL and 90 mg/mL

Puede tener que recibir atención en más de un centro de tratamiento al comenzar y continuar con TECVAYLI®

Deberá ser hospitalizado cuando comience el tratamiento con TECVAYLI®. Allí es donde debe recibir su régimen de administración escalonada para que se lo pueda controlar durante al menos 48 horas después de cada dosis escalonada y asegurarse de que tolera el tratamiento. Una vez finalizado el régimen de administración escalonada, hará la transición para recibir dosis continuas de tratamiento, que pueden administrarse en un centro de tratamiento diferente en el entorno ambulatorio.

Estos son algunos consejos a tener en cuenta durante las transiciones en la atención:

Después de un régimen de administración escalonada inicial, se le administrará TECVAYLI® todas las semanas, y luego en adelante, dosis continuas de tratamiento posiblemente en una ubicación diferente.

Su equipo de atención puede ayudarle a coordinar estas citas y, si lo desea, puede considerar programar la primera cita antes de irse del hospital. Esta debe tener lugar una semana después de su primera dosis de tratamiento.

Para ayudarle a hacer un seguimiento del tratamiento, el folleto *Comenzar con TECVAYLI®* incluye una sección para que anote cada vez que se le administre una dosis de TECVAYLI®.

También es una buena idea hacer un seguimiento de cómo se siente cada día para que pueda conversarlo con su equipo de atención y ayudarles a determinar si está experimentando efectos secundarios.

Recuerde llevar siempre su Tarjeta de Paciente con usted para poder identificarse fácilmente como alguien que recibe TECVAYLI®.

Lea la Información de seguridad importante completa en las páginas 4 a 7, y la Información completa de prescripción, incluido el Recuadro de ADVERTENCIAS, de TECVAYLI®.

Continúe con el plan de tratamiento que le recetó su médico para aprovechar TECVAYLI® al máximo

Hable con su proveedor de atención médica acerca de lo siguiente:

- ☐ Dónde y con qué frecuencia recibirá las dosis escalonadas y las dosis continuas de tratamiento de TECVAYLI®
- ☐ Conocimiento sobre los signos de posibles efectos secundarios a los que estar atento y a quién contactar en caso de que experimente efectos secundarios
- ☐ Cualquier receta u otros tratamientos que esté recibiendo actualmente
- ☐ Cualquier alergia que pueda tener
- ☐ Opciones de apoyo y ahorros de TECVAYLI withMe

Asegúrese de tener:

- ☐ Transporte hacia/desde sus citas
- ☐ Estar preparado para ser hospitalizado durante 48 horas después de la administración de todas las dosis dentro del régimen de administración escalonada de TECVAYLI®
- ☐ Recursos impresos, como *el Folleto para el paciente de TECVAYLI®, la Guía para comenzar con TECVAYLI®, la Guía del acompañante de atención y la Tarjeta de paciente*
- ☐ Números de contacto importantes agendados en su teléfono para poder ponerse en contacto fácilmente con su equipo de atención
- ☐ Apoyo de un acompañante de atención, amigos o familiares

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (más)

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre TECVAYLI®? (más)

Problemas neurológicos. Entre los síntomas de problemas neurológicos con TECVAYLI® se incluyen los siguientes:

- dolor de cabeza
- movimientos espasmódicos
- rigidez muscular
- sensación de intranquilidad
- adormecimiento y hormigueo (sensación de “alfileres y agujas”)
- confusión
- problemas para hablar
- espasmos musculares
- temblores
- visión doble
- cambios en la caligrafía
- problemas para caminar
- debilidad muscular en el cuerpo o la cara
- pérdida de la audición
- dolor ardiente, palpitante o punzante

TECVAYLI® (teclistamab-cqyv) Injection for subcutaneous use 10 mg/mL and 90 mg/mL

Síndrome de liberación de citocinas (CRS) y problemas neurológicos

TECVAYLI® puede causar efectos secundarios que son graves, potencialmente mortales o que provocan la muerte, incluidos el CRS y problemas neurológicos. TECVAYLI® activa las células inmunitarias para ayudar a combatir la enfermedad, y esto puede provocarle CRS. Su proveedor le administrará medicamentos previos y usará una administración escalonada para reducir la probabilidad y gravedad de CRS. El tratamiento previo también puede ser necesario para las dosis administradas tras un retraso de la dosis.

Llame a su proveedor de atención médica de inmediato si desarrolla alguno de los síntomas que se enumeran a continuación en cualquier momento durante su tratamiento con TECVAYLI®.

Cómo reconocer los efectos secundarios

Puede ocurrir el síndrome de liberación de citocinas con TECVAYLI® y puede presentarse con los siguientes síntomas:

- fiebre (100.4 °F o más)
- dificultad para respirar
- escalofríos
- mareos o aturdimiento
- latidos rápidos
- sensación de ansiedad
- confusión o inquietud
- dolor de cabeza
- aumento de las enzimas hepáticas en la sangre

Pueden ocurrir problemas neurológicos con TECVAYLI® y pueden presentarse con los siguientes síntomas:

- dolor de cabeza
- movimientos espasmódicos
- rigidez muscular
- sensación de intranquilidad
- adormecimiento y hormigueo (sensación de “alfileres y agujas”)
- confusión
- problemas para hablar
- espasmos musculares
- temblores
- visión doble
- cambios en la caligrafía
- problemas para caminar
- debilidad muscular en el cuerpo o la cara
- pérdida de la audición
- dolor ardiente, palpitante o punzante

CONOZCA MÁS SOBRE LOS EFECTOS SECUNDARIOS

Pueden aplicarse tarifas de datos

Lea la Información de seguridad importante completa en las páginas 4 a 7, y la Información completa de prescripción, incluido el Recuadro de ADVERTENCIAS, de TECVAYLI®.

Cómo reconocer los efectos secundarios

Pueden ocurrir problemas hepáticos con TECVAYLI® y pueden presentarse con los siguientes síntomas:

- cansancio
- pérdida del apetito
- dolor en la parte superior derecha del estómago (abdomen)
- orina oscura
- color amarillento en la piel o en la esclerótica (parte blanca) de los ojos

También pueden ocurrir infecciones con TECVAYLI® y deben considerarse durante el tratamiento.

Consideraciones de infecciones:
Las infecciones del tracto respiratorio superior y la neumonía son comunes con TECVAYLI®. TECVAYLI® puede causar infecciones bacterianas y virales que son graves, potencialmente mortales o que pueden causar la muerte.

- Su proveedor de atención médica lo controlará para detectar signos y síntomas de infección antes y durante el tratamiento con TECVAYLI®.
- Su proveedor de atención médica puede recetarle medicamentos para ayudar a prevenir infecciones y tratarlo según sea necesario si desarrolla una infección durante el tratamiento con TECVAYLI®.
- Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si presenta fiebre, escalofríos o signos o síntomas de una infección.
- Asegúrese de estar al día con las vacunas, como la de la COVID-19, contra la gripe, el virus de la varicela zóster (VVZ) y la antineumocócica.

Disminución en el recuento de glóbulos blancos

La disminución en el recuento de glóbulos blancos es común con TECVAYLI® y también puede ser grave. A veces, también se produce fiebre con recuentos bajos de glóbulos blancos y puede ser un signo de que tiene una infección.

Su proveedor de atención médica verificará sus recuentos de células sanguíneas antes de comenzar y durante el tratamiento con TECVAYLI®, y lo tratará según sea necesario.

Reacciones alérgicas y reacciones en el lugar de la inyección.

TECVAYLI® puede causar reacciones alérgicas que pueden afectar todo el cuerpo (sistémicas) y también causar reacciones en el lugar de la inyección.

Los efectos secundarios más comunes de TECVAYLI® son los siguientes:

- fiebre
- dolor en las articulaciones y los músculos, los músculos de la espalda y el pecho, y en los brazos y las piernas
- cansancio y debilidad
- infección del tracto respiratorio superior y neumonía. Consulte “Infecciones” arriba.
- náuseas
- dolor de cabeza
- diarrea

Hable con un médico de inmediato si desarrolla alguno de los signos o síntomas de los efectos secundarios que se presentan en estas páginas.

Lea la Información de seguridad importante completa en las páginas 4 a 7, y la Información completa de prescripción, incluido el Recuadro de ADVERTENCIAS, de TECVAYLI®.

USE LA SIGUIENTE TABLA PARA HACER UN SEGUIMIENTO DE SUS DOSIS DE TECVAYLI®

Comparta este registro con su equipo de atención médica en sus citas de seguimiento.

Dosis	Fecha y hora	Notas
Dosis escalonada 1		
Dosis escalonada 2		
Dosis de tratamiento		
Dosis de tratamiento		
Dosis de tratamiento		
Dosis de tratamiento		
Dosis de tratamiento		
Dosis de tratamiento		
Dosis de tratamiento		
Dosis de tratamiento		
Dosis de tratamiento		
Dosis de tratamiento		
Dosis de tratamiento		
Dosis de tratamiento		
Dosis de tratamiento		

Tenga en cuenta que esto no pretende proporcionar asesoramiento médico, diagnóstico, tratamiento ni cura para ninguna enfermedad. Esto no debe sustituir su plan de tratamiento individual con su proveedor de atención médica. Siempre debe hablar con su equipo de atención médica sobre cualquier duda o inquietud que pueda tener sobre la programación, el tratamiento o la administración.

Para continuar con el seguimiento de sus tratamientos, vaya a TECVAYLI.com/resources para descargar e imprimir copias adicionales.

Lea la Información de seguridad importante completa en las páginas 4 a 7, y la Información completa de prescripción, incluido el Recuadro de ADVERTENCIAS, de TECVAYLI®.

USE LA SIGUIENTE TABLA PARA HACER UN SEGUIMIENTO DE CÓMO SE SIENTE MIENTRAS RECIBE TECVAYLI®

TECVAYLI® (teclistamab-cqyv) Injection for subcutaneous use 10 mg/mL and 90 mg/mL

Comparta este registro con su equipo de atención médica en sus citas de seguimiento.

Fecha	¿Cómo se siente?	Notas
P. ej.: 4/18/24	*Cansado*	*Empezó después del almuerzo y duró 2 horas*

Póngase en contacto con su proveedor de atención médica de inmediato si cree que está experimentando un efecto secundario.

REGISTRO DE LA TEMPERATURA

Use la siguiente tabla para hacer un seguimiento de su temperatura mientras recibe TECVAYLI®

Hable con su proveedor de atención médica sobre la frecuencia con la que debe controlar su temperatura y durante cuánto tiempo, y llámelo o busque ayuda de emergencia de inmediato si presenta fiebre de 100.4 °F o más.

Fecha	Hora/temperatura	Hora/temperatura	Hora/temperatura
P. ej.: 4/18/24	*98.8° a las 9 A. M.*	*99.2° a las 12 P. M.*	*97.9° a las 6 P. M.*

Lea la Información de seguridad importante completa en las páginas 4 a 7, y la Información completa de prescripción, incluido el Recuadro de ADVERTENCIAS, de TECVAYLI®.

SU EQUIPO DE ATENCIÓN MÉDICA

Use el espacio a continuación para escribir los nombres y números de teléfono del equipo de atención que maneja su tratamiento con TECVAYLI® para tener siempre a mano su información en caso de que necesite ponerse en contacto con ellos.

Nombre de mi oncólogo principal: _____

Número de teléfono: _____

Nombre de mi enfermero principal: _____

Número de teléfono: _____

Use el espacio a continuación para anotar lo que quiera compartir con su equipo de atención médica en su próxima cita.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

USE ESTE ESPACIO PARA PRACTICAR SU ESCRITURA A MANO MIENTRAS RECIBE TECVAYLI®

TECVAYLI® (teclistamab-cqyv) Injection for subcutaneous use 10 mg/mL and 90 mg/mL

Una forma de detectar problemas neurológicos mientras recibe TECVAYLI® es monitorear su escritura a mano. Use estas páginas para practicar la escritura y notifique a su proveedor de atención médica si observa algún cambio.

Lea la Información de seguridad importante completa en las páginas 4 a 7, y la Información completa de prescripción, incluido el Recuadro de ADVERTENCIAS, de TECVAYLI®.

TECVAYLI®
(teclistamab-cqyv) Injection for subcutaneous use
10 mg/mL and 90 mg/mL

ESCANEE
con su teléfono inteligente y pulse el enlace para visitar **TECVAYLI.com** y obtener más información, o para registrarse para ver recursos adicionales.

Pueden aplicarse tarifas de datos

Lea la Información de seguridad importante completa en las páginas 4 a 7, y la Información completa de prescripción, incluido el Recuadro de ADVERTENCIAS, de TECVAYLI®.

© Johnson & Johnson and its affiliates 2025 02/25 cp-402923v2